

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO

Nada Duhović

**MIŠLJENJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U
VARAŽDINSKOJ I ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI O
ŠTETNOSTI ALKOHOLA**

Diplomski rad

Čakovec, 2018.

Ciljevi istraživanja

- Ispitati postoje li razlike u mišljenjima o konzumaciji alkohola između učenika medicinskih škola i gimnazija u Zagrebačkoj i Varaždinskoj županiji.
- Ispitati postoje li razlike u mišljenjima o dostatnosti nastavnih sadržaja o alkoholizmu između učenika medicinskih škola i gimnazija u Zagrebačkoj i Varaždinskoj županiji.
- Ispitati postoje li razlike u empatiji prema alkoholiziranoj osobi između učenika medicinskih škola i gimnazija u Zagrebačkoj i Varaždinskoj županiji.
- Ispitati postoje li razlike u mišljenjima o utjecaju škole, obitelji i društva na stavove o alkoholizmu između učenika medicinskih škola i gimnazija u Zagrebačkoj i Varaždinskoj županiji.

Ispitanici i metode

- USTROJ STUDIJE – provedena je presječna studija
- ISPITANICI
 - učenici petog razreda srednje medicinske škole u Varaždinu (Medicinska škola Varaždin) i u Zagrebu (Škola za medicinske sestre Vinogradska) te učenici drugih i trećih razreda Prve i Druge gimnazije u Varaždinu.
 - Ukupno je anketiran 301 ispitanik u sve četiri škole
 - za učenike mlađe od 18 godina tražen je osim njihovog osobnog dobrovoljnog pristanka i pristanak roditelja za sudjelovanje u istraživanju

Ispitanici i metode

- METODE
- posebno dizajnirani anketni upitnik – 40 pitanja – tri dijela:
 - osnovni podatci o ispitanicima
 - mišljenja i navike vezane uz konzumaciju alkohola
 - procjena znanja i mišljenja o štetnosti konzumacije alkohola

Ispitanici i metode

- STATISTIČKE METODE
 - Razlike kategorijskih varijabli testirane su Hi-kvadrat testom i Fisherovim egzaktnim testom
 - Normalnost raspodjele numeričkih varijabli testirana je Shapiro-Wilkovim testom
 - Razlike numeričkih varijabli između dviju nezavisnih skupina testirane su Kruskal Wallisovim testom
 - Razina značajnosti je postavljena na Alpha = 0,05


Rezultati

- Učenici srednje medicinske škole značajnije više žive u mjestu s manje od 5000 stanovnika (**može se objasniti geografskim značajkama Varaždinske županije**).
- Učenici Prve gimnazije u Varaždinu značajnije su mlađi u odnosu na ostale škole, te im je i dob prvog konzumiranja alkohola bez znanja roditelja značajnije mlađa (**rezultat je slučajnog odabira učenika u toj školi**).
- 51,8% svih ispitanih učenika nikad se nije napilo, a da nije znalo za sebe, dok su se ostali tako napili ponekad, vikendom ili često (**statistički nema značajnih razlika između škola**).

Rezultati

- 66,3 % učenika izjavljuje da su rijetko u opitom stanju, a ostali su u opitom stanju vikendima (31,5%) i gotovo svakodnevno (2,2%) (**statistički nema značajnih razlika između škola**).
- **87% učenika konzumiralo je alkohol u prisustvu roditelja** (**statistički nema značajnih razlika između škola**).
- U školi o štetnosti alkohola najviše se slušalo na SRO (78,7%). **Značajnije manje učenika Škole za medicinske sestre Vinogradska** su isto slušali na SRO, jer oni o tome uče na nizu drugih predmeta.


Školski predmeti u sklopu kojih su učili o štetnosti konzumacije alkohola



Rezultati

- 77% učenika mišljenja je da su i prije predavanja u školi dovoljno znali o štetnosti alkohola.
- Značajno više učenika iz Medicinske škole Varaždin smatra se dovoljno odraslim da uvijek mogu prestati s konzumacijom istog (**oni su bili i najstarija ispitana skupina**)
- Nema bitno izraženih mišljenja kod učenika na pitanjima **što je na njih ostavilo najjači dojam na predavanjima o štetnosti alkohola i što bi trebalo uvesti u program škole kako bi se više naučilo o štetnosti alkohola** (**statistički nema značajnih razlika između škola**).

Što bi učinili da nađu na vidno alkoholiziranu osobu koja leži na javnom mjestu



Rezultati

- Učenici najčešće odgovaraju da piju alkohol zbog zabave (66%) (**statistički nema značajnih razlika između škola**).
- Učenici medicinskih škola statistički značajno više piju mješavine alkoholnih pića sa sokom u odnosu na gimnazijalce **što možemo protumačiti njihovom većom svjesnošću o štetnosti alkohola**.
- Preko 90% učenika svjesno je posljedica konzumacije alkohola (**statistički nema značajnih razlika između škola**).
- Učenici Medicinske škole u Varaždinu su značajnije više učili o alkoholu i alkoholizmu od ostalih učenika.

Rezultati

- Da bi trebali i više slušati o temi alkoholizma smatraju učenici obje medicinske škole.
- 72% učenika se slažu i potpuno slažu da su im roditelji često govorili o štetnosti alkohola.
- 73% učenika seslažu i potpuno slažu da postoje i gore štetnosti za organizam od konzumacije alkohola.
- 64% učenika seslažu i potpuno slažu da vole povremeno popiti nešto alkoholno.

Rezultati

- 95% učenika se potpuno ne slažu i ne slažu da su ovisni o alkoholu.
- Učenici Prve gimnazije značajnije više od ostalih misle da osim štetnosti po njihovo zdravlje alkohol ima veliki utjecaj i na njihovo obrazovanje.
- 67% učenika se slažu i potpuno slažu da su pijane osobe opasne odnosno nesigurne u svom radu
- Učenici Druge gimnazije značajnije više od ostalih misle da bi i sami nešto popili kada bi se nalazili u društvu gdje se konzumira alkohol
- Da alkohol mogu imati kada to poželete značajnije više od ostalih misle učenici škole u Vinogradskoj i Druge gimnazije

Rezultati

- 56% učenika se slažu i potpuno slažu da je pojavljivanje pijanih osoba u javnosti sramotno i neodgovorno.
- Da je alkoholizam bolest značajnije više misle učenici obje medicinske škole.
- Značajnije manje učenici škole u Vinogradskoj smatraju da uvijek mogu prestati konzumirati alkohol.
- 95% učenika svjesno je da ne smiju sjesti za volan ako popiju.
- 87% učenika misli da mogu biti u društvu koje konzumira alkohol, a da ga sami ne konzumiraju.

Zaključci

- Umjeroeno pijenje alkoholnih pića još uvijek se smatra društveno prihvatljivim ponašanjem te roditelji još uvijek nisu dovoljno senzibilizirani o opasnostima alkohola po njihovu djecu.
- Učenici srednjih medicinskih škola više su senzibilizirani o štetnosti alkohola i bolje su educirani o toj problematiki od učenika gimnazija.

Zaključci

- Učenici srednjih medicinskih škola imaju veću empatiju prema alkoholiziranim osobama i prema njima bi postupali kao prema bolesnicima u odnosu na učenike gimnazija koji na alkoholizam uglavnom ne gledaju kao na bolest.
- Utjecaj roditelja i društva na mišljenje mladih o štetnosti alkohola još uvijek je puno veći u odnosu na utjecaj škole.

„Mladost imamo da bi činili gluposti, a starost da bi za tim
glupostima žalili”

Honoré de Balzac